



TDAH –

Nous effectuons une étude sur le **Trouble Déficitaire de l'Attention et de l'Hyperactivité** chez l'adulte. Nous invitons des hommes âgés de 18 à 45 ans qui ont pris des médicaments pour le TDAH (ex. **Ritalin**) pendant leur enfance et qui continuent à être significativement affectés par les symptômes suivants: difficulté à rester en place, hyperactivité motrice, impulsivité, facilement frustré, rêveur et distrait, et problèmes de concentration affectant la mémoire et l'attention. Les participants doivent avoir pris des médicaments pour le TDAH pour au moins un an, mais ne doivent plus en prendre présentement.

La participation comprend une évaluation psychologique, un examen physique incluant un bilan biologique, des scans de TEP* et d'IRM†, et des tests de cognition appropriés. Le scan de TEP comprend l'administration orale d'une dose de Dexedrine. Les participants seront compensés pour la perte de revenu que leur participation aura occasionnée.

Pour plus d'informations, veuillez contacter **Jennifer** ou **Mariya** au 514-398-4916 ou par courriel: McGill.ADHD@gmail.com



Cette étude est effectuée sous la supervision conjointe des Dr. Benkelfat MD et Leyton PhD, membres du Département de Psychiatrie de l'Université McGill.

* Tomographie par Émission de Positons † Imagerie par Résonance Magnétique